

Este folleto explica cómo preparar dosis de emergencia de

Doxiciclina

para bebés y niños expuestos al ántrax

*Una vez que haya sido notificado por sus autoridades federales, estatales y locales que la población ha sido expuesto a ántrax, puede ser necesario que prepare pastillas de ciprofloxacina para hacer algunas dosis de **emergencia** de ciprofloxacina para bebés y niños.*

Se necesita:

- Una pastilla de (1) 100 miligramos (mg) de doxiciclina
- Una cucharilla de metal
- Cucharas de medir [1 cucharilla; and ½ cucharilla]
(NOTA: cucharas de medir son preferibles; no obstante, si no están disponibles, se puede usar la cuchara de metal para moler, medir y administrar la medicina)
- 1 tazón pequeño
- Agua
- Una de las siguientes comidas o bebidas:
 - almíbar de chocolate
 - almíbar de arce
 - mermelada de fresa
 - jugo de manzana

Directions:

1. Ponga una (1) tableta de doxiciclina de 100 mg. dentro del tazón. Agregue dos (2) cucharillas niveladas de agua. Mezcle el agua y la pastilla durante un minuto. Aplaste la pastilla con el dorso de la cuchara hasta que ya no se vean pedazos grandes.



2. Agregue cuatro (4) cucharillas de una bebida o comida a la mezcla de ciprofloxacina y agua. Revuélvalas hasta que la droga esté bien disuelta.



Cuánta Mezcla de doxiciclina hay que suministrar al niño

La cantidad de cucharillas de la mezcla de doxiciclina suministrada al niño depende del peso del niño. **Si no se conoce el peso del niño, hay que pesarlo antes de suministrar la primera dosis.** La tabla explica cuánta dosis de Doxiciclina se debe dar al niño de acuerdo con su peso. Se debe suministrarle dos dosis diarias (una por la mañana y una por la tarde.)

Si el niño pesa	Suministre
4 – 11.5 libras	Media (1/2) cucharilla de la mezcla de doxiciclina
11.5 – 22.5 libras	Una (1) cucharilla de la mezcla de doxiciclina
22.5 – 33.5 libras	Una y media (1 ½) cucharillas de la mezcla de doxiciclina
33.5 - 45 libras	Dos (2) cucharillas de la mezcla de doxiciclina
45 - 55 libras	Dos y media (2 ½) cucharillas de la mezcla de doxiciclina
55 - 65 libras	Tres (3) cucharillas de la mezcla de doxiciclina
65 - 77 libras	Tres y media (3 ½) cucharillas de la mezcla de doxiciclina
77 - 88 libras	Cuatro (4) cucharillas de la mezcla de doxiciclina
Niños que pesan más de 88 libras que son expuestos al ántrax deben tomar una (1) pastilla de 100 mg. de Doxiciclina dos veces diarias (a la misma hora cada día, si es posible) durante 60 días. Si el niño no se puede tragar las pastillas, siga las indicaciones previas para preparar una mezcla y déle 4 cucharillas dos veces cada día.	

Como se debe almacenar la mezcla de mezcla de doxiciclina

- Doxiciclina mezclada con cualquiera de las bebidas o comidas recomendadas se mantendrá fresca durante 24 horas.
- Guarde la mezcla en un recipiente cubierto dentro de la nevera.
- Las mezclas hechas con jugos pueden ser guardadas al clima.
- Prepare una mezcla de doxiciclina cada día; porciones no usadas deben ser botadas.

